

## Bed 1

### Blomsterblanding til LAR

Blandingen indeholder udelukkende flerårige arter, som har en god konkurrencekraft under fugtige forhold. Arter som blodrød storkenæb, akeleje og dagpragtstjerne tåler samtidig tørre forhold i et vist omfang.

Link:

<https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/blomsterblanding-til-lar-prod2420>

**Forbehandling af jord:** Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses. Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudtsarter

**Såtidspunkt:** april-maj og eftersås i august-september. Ved såning kan frøene med fordel blandes op med tørt sand, for at opnå større volumen og bedre fordeling.

**Udsædsmængde:** 1,5 kg pr. 1000 m<sup>2</sup> (250 gr - 166 m<sup>2</sup>)

**Blomstring:** marts - oktober

**plantehøjde:** 50 - 60 cm

**Pleje:** Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring. Afklippet skal fjernes.

#### Indhold:

Flerårige: Dagpragtstjerne, *Silene dioica*\* ; Alm. mjøduert, *Filipendula ulmaria*; Kattehale, *Lythrum salicaria*; Akeleje, *Aquilegia vulgaris*\*; Eng-storkenæb, *Geranium pratense*\*; Trævlekrone, *Lychnis flos cuculi*; Hulkravet kodriver, *Primula veris*; Iris, *Iris sibirica*; Blodrød storkenæb, *Geranium sanguineum*\*; Aksærenpris, *Veronica spicata*; Engkarse, *Cardamine pratensis*; Skov-forglemmigej, *Myosotis alpestris*\*

\*Arter der også er tålsomme overfor tørre forhold



## Bed 2

### Engblanding til lerjord

God konkurrencekraft og arter med en høj pollen- og nektarproduktion. En stor del af arterne er vildtvoksende i Danmark. Der indgår enårige arter for en rig blomsting allerede første år. Derefter tager de flerårige arter over. Engblanding til lerjord anbefales af Danmarks Biavlerforening.

Link:

<https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/engblanding-til-lerjord-751bl1014>

**Forbehandling af jord:**Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses.

Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudtsarter

**Såtidspunkt:** midt april - start juni. Ved såning kan frøene med fordel blandes op med tørt sand, for at opnå større volumen og bedre fordeling.

**Udsædsmængde:** 2 kg pr. 1000 m<sup>2</sup>

**Blomstring:** maj - oktober

**plantehøjde:** 60 - 80 cm

**Pleje:** Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring. Afklippet skal fjernes.

#### Indhold:

Flerårige: Hørblomst, *Linum perenne*; Forglemmigej, *Myosotis alpestris*; Alm. røllike, *Achillea millefolium*; Fjernellike, *Dianthus plumarius*; Bibernelle, *Sanguisorba officinalis*; Moskus-katost, *Malva moschata*; Hvid okseøj, *Chrysanthemum leucanthemum*; Studenternellike, *Dianthus barbatus*; Akeleje, *Aquilegia vulgaris*  
Enårige: Morgenfrue, *Calendula officinalis*; Kornblomst, *Centaurea cyanus*; Kornvalmue, *Papaver rhoeas*; Hør, *Linum grandiflorum rubrum*; Judaspøge, *Lunaria annua*; Skærmsløjfeblomst, *Iberis umbellata*; Klinte, *Agrostemma githago*; Alm. hjulkrone, *Borago officinalis*; Brudeslør, *Gypsophila elegans*; Ridderspøge, *Delphinium consolida*; Knippelmurt, *Silene armenia*  
Toårige: Gyldenlak, *Cherianthus cheirii/allionii*; Alm. slangehoved, *Echium vulgare*; Fingerbøl, *Digitalis purpurea*



## Bed 3

### Sommerfugleblanding

Flerårig frøblanding med 21 vilde blomsterarter. Velegnet til at tiltrække sommerfugle

<https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/sommerfugleblanding-prod3001>

**Forbehandling af jord:** Jorden bør før ny-anlægning enten pløjes eller fræses. Efterfølgende såbeds-harves eller fræses så jorden får en finkrummet struktur. Derefter lader man arealet ligge i 2-3 uger for at jorden kan sætte sig. Arealer med et stort ukrudtstryk bør man før anlægning holde arealet sortbrak (vegetationsfrit). Man harver eller fræser arealet regelmæssigt, dermed kan man effektivt håndtere disse hurtigt ukrudsarter

**Såtidspunkt:** Midt april-primus juni og eftersås august-september

**Udsædsmængde:** 2 kg pr. 1000 m<sup>2</sup>

For at opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med tørt sand

**Blomstring:** April-september

**Pleje:** Skal klippes én gang om året i ca. 10 cm højde efter afblomstring. Afklippet skal fjernes. Der må ikke gødes.

Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel m.fl., er det nødvendigt at håndluge, før de kaster frø. Alternativt en sommerslåning. Afklippet skal fjernes.


#### Indhold:

Flerårig: Alm. Røllike, *Achillea millefolium*; Purpursolhat, *Echinacea purpurea*; Knoldet mjøddurt, *Filipendula vulgaris*; Blodrød storkenæb, *Geranium sanguineum striatum*; Kæmpe margurit, *Leucanthemum aximum*; Moskuskatost, *Malva moschata*; Hulkravet kodriver, *Primula veris*

Enårig: Kornblomst, *Centaurea cyanus*; Alm. hjulkrone, *Borago officinalis*; Morgenfrue, *Calendula officinalis*; Atlaskblomst, *Godetia grandiflora*; Brudeslør, *Gypsophila elegans*; Judaspenge, *Lunaria annua*

Toårig: Alm. Slangehoved, *Echium vulgare*; Gyldenlak, *Cherianthus cheirii*;

Humle-sneglebælg, *Medicago lupulina*; Velduftende aftenstjerne, *Hesperis matronalis*



## Bed 4

### Ny Nordisk - spiselige blomster

Blandingen er sammensat af forskellige spiselige blomster og urter. Mange af urterne indgår i det nye nordiske køkken, eksempelvis ramsløg, havrerod og natlys. Blandingen indeholder både enårige, toårige og flerårige. Det sikrer blomstring over en lang periode fra år 1.

<https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/ny-nordisk-prod1155>

**Forbehandling af jord:** De første 10 cm muldjord skræbes af og jorden pløjes eller fræses.

**Såtidspunkt:** Midt i april - primo juni samt august - midt september.

**Udsædsmængde:** 2-3 kg pr. 1000 m<sup>2</sup>. For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med sand.

**Blomstring:** maj til frosten sætter ind.

**Plantehøjde:** 50 - 80 cm

**Pleje:** Særligt i etableringsfasen er det vigtigt at fjerne ukrudt. Kraftigt rodukrudt skal fjernes løbende. Det anbefales at klippe ned i slutningen af september i ca. 10 cm højde. Afklippet bør fjernes fra arealet. Tilførsel af gødning anbefales normalt ikke.

#### Indhold:

Flerårig: Ramsløg\*, *Allium ursinum*; Cikorie, *Cichorium Selvatico da Campo*; Timian, *Thymus vulgaris*; Tusindfryd, *Bellis perennis*; Romerkamille, *Chamaemelum nobile*; Hornviol, *Viola cornuta*; Alm Røllike, *Achillea millefolium*; Purløg, *Allium schoenoprasum*  
Enårig: Morgenfrue, *Calendula officinalis*; Dild, *Anethum graveolens*; Kornblomst, *Centaurea cyanus*; Anis, *Pimpinella anisum*

Toårig: Gulerod, *Daucus carota*; Natlys, *Oenothera biennis*

\*Ramsløg kan forveksles med liljekonval og høsttidløs, som er giftige. Indsamling i ramsløgs blomstringsperiode er det mest sikre, da den her er meget nem at kende.

# Etableringsmetoder

1. Skræl græstørv af, fræsning, vent 2-3 uger, fjern ukrudt
2. Pløj (30-40 cm), vent 2.3 uger, fjern ukrudt
3. Skræl græstørv af, fræsning, så med det samme
4. Pløj (30-40 cm), så med det samme